



# Mathématiques 2

MP

2014

CONCOURS CENTRALE-SUPÉLEC

4 heures

Calculatrices autorisées

## Polynômes de Tchebychev et de Dickson, applications

### I Définitions et propriétés usuelles

Les polynômes de Tchebychev de première espèce  $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sont définis par la relation

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall \theta \in \mathbb{R}, \quad T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$$

On ne demande pas de justifier l'existence et l'unicité de la famille de polynômes définie par cette relation.

#### I.A – Polynômes de première espèce

**I.A.1)** Déterminer  $T_0, T_1, T_2$  et  $T_3$ .

**I.A.2)** En remarquant que pour tout réel  $\theta$ , on a  $e^{in\theta} = (e^{i\theta})^n$ , montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad T_n = \sum_{0 \leq k \leq n/2} \binom{n}{2k} (X^2 - 1)^k X^{n-2k}$$

Écrire en langage Maple ou Mathematica une fonction  $T$  prenant en argument un entier naturel  $n$  et renvoyant l'expression développée du polynôme  $T_n$ .

**I.A.3)** Montrer que la suite  $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$  vérifie la relation de récurrence

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad T_{n+2} = 2XT_{n+1} - T_n \quad (\text{I.1})$$

En déduire, pour tout entier naturel  $n$ , le degré et le coefficient dominant de  $T_n$ . Retrouver ce résultat avec l'expression de la [question I.A.2](#).

**I.A.4)** Montrer que, pour tout entier naturel  $n$ , le polynôme  $T_n$  est scindé sur  $\mathbb{R}$ , à racines simples appartenant à  $]-1, 1[$ . Déterminer les racines de  $T_n$ .

#### I.B – Polynômes de deuxième espèce

On définit les polynômes  $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de Tchebychev de deuxième espèce par

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad U_n = \frac{1}{n+1} T'_{n+1}$$

**I.B.1)** Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall \theta \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}, \quad U_n(\cos \theta) = \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin \theta}$$

**I.B.2)** En déduire les propriétés suivantes :

a) La suite  $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$  vérifie la même relation de récurrence [\(I.1\)](#) que la suite  $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

b) Pour tout entier naturel  $n$ , le polynôme  $U_n$  est scindé sur  $\mathbb{R}$  à racines simples appartenant à  $]-1, 1[$ .

Déterminer les racines de  $U_n$ .

## II Arithmétique des polynômes de Tchebychev

#### II.A – Division euclidienne

**II.A.1)** Montrer que

$$\begin{cases} T_m \cdot T_n = \frac{1}{2} (T_{n+m} + T_{n-m}) & \text{pour tous entiers } 0 \leq m \leq n \\ T_m \cdot U_{n-1} = \frac{1}{2} (U_{n+m-1} + U_{n-m-1}) & \text{pour tous entiers } 0 \leq m < n \end{cases}$$

**II.A.2)** Pour  $m$  et  $n$  entiers naturels tels que  $m \leq n$ , on se propose de déterminer le quotient  $Q_{n,m}$  et le reste  $R_{n,m}$  de la division euclidienne de  $T_n$  par  $T_m$ .

a) On suppose  $m < n < 3m$ . Montrer que

$$Q_{n,m} = 2T_{n-m} \quad \text{et} \quad R_{n,m} = -T_{|n-2m|}$$

b) Déterminer  $Q_{n,m}$  et  $R_{n,m}$  lorsque  $n$  est de la forme  $(2p+1)m$  avec  $p \in \mathbb{N}^*$ .

c) On suppose que  $m > 0$  et que  $n$  n'est pas le produit de  $m$  par un entier impair. Montrer qu'il existe un unique entier  $p \geq 1$  tel que  $|n - 2pm| < m$  et que

$$Q_{n,m} = 2 \left( T_{n-m} - T_{n-3m} + \cdots + (-1)^{p-1} T_{n-(2p-1)m} \right) \quad \text{et} \quad R_{n,m} = (-1)^p T_{|n-2pm|}$$

### II.B – Plus grand commun diviseur

Dans toute cette **sous-partie II.B**, on fixe deux entiers naturels  $m$  et  $n$ .

**II.B.1)** Soit  $h$  le pgcd dans  $\mathbb{N}$  de  $m+1$  et  $n+1$ . En examinant les racines communes à  $U_n$  et  $U_m$ , montrer que  $U_{h-1}$  est un pgcd dans  $\mathbb{R}[X]$  de  $U_n$  et  $U_m$ .

**II.B.2)** Soit  $g > 0$  le pgcd de  $m$  et  $n$ . On pose  $m_1 = m/g$  et  $n_1 = n/g$ .

a) Montrer que si  $m_1$  et  $n_1$  sont impairs, alors  $T_g$  est un pgcd de  $T_n$  et  $T_m$ .

b) Montrer que si l'un des deux entiers  $m_1$  ou  $n_1$  est pair, alors  $T_n$  et  $T_m$  sont premiers entre eux.

c) Que peut-on dire des pgcd de  $T_n$  et  $T_m$  lorsque  $m$  et  $n$  sont impairs ? Lorsque  $n$  et  $m$  sont deux puissances de 2 distinctes ?

## III Un théorème

Dans cette partie, on munit l'ensemble  $\mathbb{C}[X]$  des polynômes complexes de la loi de composition interne associative donnée par la composition, notée  $\circ$ . Plus précisément, étant donné  $P, Q \in \mathbb{C}[X]$ , si  $P = \sum_{k=0}^{+\infty} p_k X^k$ , la suite  $(p_k)_{k \in \mathbb{N}}$  étant nulle à partir d'un certain rang, on a

$$P \circ Q = \sum_{k=0}^{+\infty} p_k Q^k$$

On dit que les polynômes  $P$  et  $Q$  commutent si  $P \circ Q = Q \circ P$ . On note  $\mathcal{C}(P)$  l'ensemble des polynômes complexes qui commutent avec le polynôme  $P$

$$\mathcal{C}(P) = \{Q \in \mathbb{C}[X], P \circ Q = Q \circ P\}$$

On cherche dans cette partie les familles  $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de polynômes complexes vérifiant

$$\forall n \in \mathbb{N}, \deg F_n = n \quad \text{et} \quad \forall (m, n) \in \mathbb{N}^2, \quad F_n \circ F_m = F_m \circ F_n \quad (\text{III.1})$$

Il est clair que la famille  $(X^n)_{n \in \mathbb{N}}$  convient.

On note  $G$  l'ensemble des polynômes complexes de degré 1, et pour  $\alpha \in \mathbb{C}$ , on pose  $P_\alpha = X^2 + \alpha$ .

### III.A – Préliminaires

**III.A.1)** Montrer que la famille  $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$  vérifie la propriété (III.1). On pourra comparer  $T_n \circ T_m$  et  $T_{mn}$ .

**III.A.2)** Vérifier que  $G$  est un groupe pour la loi  $\circ$ .

L'inverse pour la loi  $\circ$  d'un élément  $U$  de  $G$  sera noté  $U^{-1}$ .

### III.B – Commutant de $X^2$ et $T_2$

**III.B.1)** Soit  $\alpha \in \mathbb{C}$  et soit  $Q$  un polynôme complexe non constant qui commute avec  $P_\alpha$ . Montrer que  $Q$  est unitaire.

**III.B.2)** En déduire que, pour tout entier  $n \geq 1$ , il existe au plus un polynôme de degré  $n$  qui commute avec  $P_\alpha$ . Déterminer  $\mathcal{C}(X^2)$ .

**III.B.3)** Soit  $P$  un polynôme complexe de degré 2. Justifier l'existence et l'unicité de  $U \in G$  et  $\alpha \in \mathbb{C}$  tels que  $U \circ P \circ U^{-1} = P_\alpha$ . Déterminer ces deux éléments lorsque  $P = T_2$ .

**III.B.4)** Justifier que  $\mathcal{C}(T_2) = \{-1/2\} \cup \{T_n, n \in \mathbb{N}\}$ .

### III.C –

**III.C.1)** Montrer que les seuls complexes  $\alpha$  tels que  $\mathcal{C}(P_\alpha)$  contienne un polynôme de degré trois sont 0 et  $-2$ .

**III.C.2)** En déduire le théorème de Block et Thielmann : si  $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$  vérifie (III.1), alors il existe  $U \in G$  tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad F_n = U^{-1} \circ X^n \circ U \quad \text{ou} \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad F_n = U^{-1} \circ T_n \circ U$$

## IV Puissances dans $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$

Dans toute cette partie, on note  $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$  l'ensemble des éléments inversibles de l'anneau  $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$ , muni de son addition et de sa multiplication usuelle.

**IV.A** – Justifier qu'un élément  $M$  de  $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$  appartient à  $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$  si et seulement si  $|\det M| = 1$ .

**IV.B** – On introduit les polynômes de Dickson de première et deuxième espèce,  $(D_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(E_n)_{n \in \mathbb{N}}$ , définis sous la forme de fonctions polynomiales de deux variables par

$$D_0(x, a) = 2 \quad D_1(x, a) = x \quad E_0(x, a) = 1 \quad E_1(x, a) = x$$

puis, pour tout entier  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$D_{n+2}(x, a) = x D_{n+1}(x, a) - a D_n(x, a) \quad \text{et} \quad E_{n+2}(x, a) = x E_{n+1}(x, a) - a E_n(x, a)$$

Justifier la relation suivante avec les polynômes de Tchebychev

$$\forall (x, a) \in \mathbb{C}^2, \quad D_n(2xa, a^2) = 2a^n T_n(x) \quad \text{et} \quad E_n(2xa, a^2) = a^n U_n(x)$$

ainsi que les deux relations suivantes, valables pour tout entier naturel  $n$  et tout  $(x, a) \in \mathbb{C}^* \times \mathbb{C}$

$$D_n\left(x + \frac{a}{x}, a\right) = x^n + \frac{a^n}{x^n} \quad \text{et} \quad \left(x - \frac{a}{x}\right) E_n\left(x + \frac{a}{x}, a\right) = \left(x^{n+1} - \frac{a^{n+1}}{x^{n+1}}\right) \quad (\text{IV.1})$$

**IV.C** – Dans cette sous-partie, on cherche une condition nécessaire et suffisante pour qu'un élément  $A$  de  $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$  soit une puissance  $n$ -ième dans  $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$ , c'est-à-dire pour qu'il existe une matrice  $B \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$  telle que  $A = B^n$ . Dans toute la suite, on notera

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \tau = \mathrm{Tr} A \quad \delta = \det A$$

**IV.C.1)** Soit  $B \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$ . On note, *dans cette question uniquement*,  $\sigma = \mathrm{Tr} B$  et  $\nu = \det B$ . Montrer pour tout  $n \geq 2$ , l'égalité

$$B^n = E_{n-1}(\sigma, \nu) \cdot B - \nu E_{n-2}(\sigma, \nu) \cdot I_2$$

où  $I_2$  est la matrice identité d'ordre 2.

Établir que  $\mathrm{Tr}(B^n) = D_n(\sigma, \nu)$ .

**IV.C.2)** En déduire que si  $A$  est une puissance  $n$ -ième ( $n \geq 2$ ) dans  $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$ , alors il existe  $\sigma \in \mathbb{Z}$  et  $\nu \in \{-1, 1\}$  tels que

- i.  $E_{n-1}(\sigma, \nu)$  divise  $b, c$  et  $a - d$ . On justifiera brièvement que  $E_{n-1}(\sigma, \nu)$  est bien un entier.
- ii.  $\tau = D_n(\sigma, \nu)$  et  $\delta = \nu^n$ .

**IV.C.3)** On va maintenant établir la réciproque.

Soit  $A$  un élément de  $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$  pour lequel il existe  $\sigma \in \mathbb{Z}$  et  $\nu \in \{-1, 1\}$  vérifiant les deux conditions précédentes **i** et **ii**. Pour simplifier, on note  $p = E_{n-1}(\sigma, \nu)$ . On définit alors une matrice  $B = \begin{pmatrix} r & s \\ t & u \end{pmatrix}$  avec

$$r = \frac{1}{2} \left( \sigma + \frac{a - d}{p} \right) \quad s = \frac{b}{p} \quad t = \frac{c}{p} \quad u = \frac{1}{2} \left( \sigma - \frac{a - d}{p} \right)$$

a) En introduisant une racine complexe du polynôme  $X^2 - \sigma X + \nu$  et à l'aide de (IV.1), montrer que

$$\tau^2 - 4\delta = p^2(\sigma^2 - 4\nu) \quad \text{puis} \quad ru - st = \nu$$

En déduire que  $B$  appartient à  $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$ .

b) Montrer que  $A = B^n$ .

**IV.C.4)** Montrer que la matrice  $A = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$  est un cube dans  $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$  et déterminer une matrice  $B \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$  telle que  $B^3 = A$ .

• • • FIN • • •